

Enfermedad Hemorrágica de Conejos

Aunque esta enfermedad no es históricamente común en los Estados Unidos, se han registrado casos del virus de la enfermedad hemorrágica de conejos serotipo 1 (RHDV1, por sus siglas en inglés) en los estados de Iowa (2000), Utah (2001), Illinois (2001), Nueva York (2001), Indiana (2005), Minnesota (2010), y Canadá (2011). Se considera endémico en Australia, Nueva Zelanda, Cuba, partes de Asia y África, así como en la mayor parte de Europa. El virus de la enfermedad hemorrágica de conejos serotipo 2 (RHDV2, por sus siglas en inglés) surgió en Francia en 2010 y desde entonces se ha propagado por Europa y es endémico en Australia. Llegó a la región suroeste de Canadá en 2018, y posteriormente provocó casos en Ohio, Washington, y la ciudad de Nueva York. A principios del 2020, se produjo un brote ampliamente expandido del RHDV2 en conejos domésticos y silvestres de la región suroeste de los Estados Unidos (Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, Nevada) y en la región norte de México. Los conejos silvestres han jugado un papel importante en la propagación continua del brote.

¿Qué es la enfermedad hemorrágica de conejos (RHD)?

La enfermedad hemorrágica de conejos (RHD, por sus siglas en inglés), también conocida como enfermedad hemorrágica viral, pueden causarla dos calicivirus relacionados.

- RHDV1: solo afecta a los conejos de la especie *Oryctolagus*, que incluye a la mayoría de conejos europeos domésticos y silvestres.
- RHDV2 afecta a la especie *Oryctolagus* y varias otras especies de conejos, como liebres silvestres (*Lepus*) y conejos de rabo blanco silvestres (*Sylvilagus*), pudiendo ser susceptibles otros géneros de conejos así como las liebres picas (familia Ochonotidae).

El periodo de incubación de la RHD es de 1 a 5 días, y puede causar inflamación del hígado (hepatitis) e impedir la coagulación de la sangre. A menudo, la muerte del animal es repentina sin mostrar señales externas de una enfermedad; o pueden mostrar:

- Fiebre
- Ictericia
- Sangrado de los orificios corporales
- Inapetencia
- Letargo
- Convulsiones
- Dificultad para respirar
- Labios o membranas mucosas azuladas



La muerte resulta de una hemorragia interna masiva y fallo renal. De los conejos susceptibles, 80-100% de animales enfermos mueren. Afecta a conejos de toda edad.

¿Los humanos u otros animales pueden contraer la enfermedad RHD?

No. Los virus de RHD solo afectan a lagomorfos de la familia Leporidae (conejos y liebres). Se han encontrado otros tipos de calicivirus en humanos, ganado, lobos de mar y gatos.

Control de la propagación de RHD

El virus de RHD puede ser inhalado, ingerido o absorbido a través de rasguños superficiales o heridas. Permanece en el medio ambiente por varios meses y puede transmitirse a través del contacto directo con conejos domésticos o silvestres infectados o el contacto indirecto con objetos (como jaulas, comederos, equipo de aseo, etc.) o las personas y sus vestimentas que se hayan contaminado mediante las secreciones o excreciones de conejos.

La transmisión puede ocurrir al consumir agua o alimentos contaminados, o la exposición a productos derivados de conejo (carne, pieles, vísceras). Las plagas de insectos o roedores, o animales domésticos y aves también pueden contaminarse con el virus y transferirlo a los conejos. Los perros pueden esparcir el virus al mover cadáveres de conejos infectados entre instalaciones.

Siga pautas de bioseguridad apropiadas para evitar la propagación de enfermedades en sus instalaciones:

- Minimice la exposición a conejos y liebres silvestres manteniendo a sus conejos en jaulas o conejeras colocadas en alto, lejos del suelo.
- No deje a sus conejos pastear o andar sueltos en el jardín o la yarda si sospecha que hay animales enfermos en su zona.
- Evite todo contacto innecesario con conejos de otras personas. Si debe tocar animales de otras personas, lávese las manos o báñese y cambie sus ropas antes de tocar sus conejos.
- Restrinja el ingreso de otras personas a su criadero y limite la manipulación de sus animales por otras personas.
- Después de visitar un show, feria o evento donde hayan otros conejos, báñese y cambie de ropa antes de tocar sus propios conejos.
- Investigue las condiciones de salud del criadero donde compra sus conejos.
- Controle el tránsito de perros, coyotes, insectos, aves, roedores y otros animales, que pueden traer enfermedades a su criadero.
- Tenga cuidado con las visitas de personas de otros estados o países donde hay casos de enfermedad de conejos y tome medidas apropiadas.
- Si piensa viajar, investigue bien sobre el estado de la enfermedad de conejos en el estado o país a donde va y tome medidas para evitar la transmisión de la RHD a sus conejos.
- Investigue bien sobre el estado de la enfermedad de conejos en el estado o país de origen de todos los equipos o suministros que compra.

Desinfectantes

El RHDV puede desactivarse con lejía al 10% (hipoclorito de sodio), peroximono de potasio (como Virkon-S al 1%), y algunos otros agentes desinfectantes.

Los compuestos de amonio cuaternario no son eficaces (incluso el Lysol en rociador, toallas de Clorox y Odoban) para eliminar el RHDV.

¿Puedo vacunar a mis conejos contra la RHD?

El uso de vacunas contra la RHD no está aprobado en los Estados Unidos, pero debido al reciente brote, se han autorizado las vacunas como una medida de emergencia limitada en los estados afectados. Para que sean eficaces, las vacunas deben tener antígenos para el serotipo apropiado, RHDV1 y RHDV2.



Para informar sobre liebres o conejos silvestres muertos, llame a CDFW Wildlife Investigations Lab:
(916) 358-2790

o visite en línea el sitio:

<https://wildlife.ca.gov/Conservation/Laboratories/Wildlife-Investigations/Monitoring/Mortality-Report>

Para informar sobre conejos domésticos muertos comuníquese con CDFA Animal Health Branch.

Consulte con su veterinario si su conejo se enferma.

División de Servicios de Salud Animal e Inocuidad Alimentaria Seccional de Salud Animal

Oficina principal - (916) 900-5002
Distrito de Redding - (530) 225-2140
Distrito de Modesto - (209) 491-9350
Distrito de Tulare - (559) 685-3500
Distrito de Ontario - (909) 947-4462

USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 o (877) 741-3690

Para más información, haga clic en:

[Animal Health Branch](#)
[Hand Washing Why, When, How, and with What?](#)